

**ΠΡΟΣΘΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ (ANTERIORLY DISPLACED ANUS)**

**Κοπανίδη Μαρία, Ιακωμίδης Εμμανουήλ, Οικονομοπούλου Αλεξάνδρα, Καμπούρογλου Γεώργιος, Κοφίνας Γεώργιος, Γεωργιάδης Αρσένιος, Περγάμαλης Γεώργιος.**

Γ' Παιδοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ ,Αθήνα

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ:** Κατά την κλινική εξέταση ενός νεογνού μπορεί να υπάρχει προβληματισμός για τη θέση του πρωκτού για το εάν πρόκειται για πρόσθια θέση του πρωκτού ή για ορθοπερινεϊκό συρίγγιο.

**ΣΚΟΠΟΣ:** Να καθοριστούν τα κύρια σημεία της διαφορικής διάγνωσης μεταξύ των δυο καταστάσεων και η αναγκαιότητα της χειρουργικής επέμβασης.

**ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:** 9 νεογνά (3 άρρενα -6 θήλεα) εξετάστηκαν κατά την περίοδο 2021-2023 λόγω αμφιβολίας από την κλινική εξέταση για το αν πρόκειται για πρόσθια θέση του πρωκτού ή ορθοπερινεϊκού συριγγίου. 4 νεογνά χρειάστηκε να εξετασθούν υπό νάρκωση με τη χρήση νευροδιεγέρτη για τον έλεγχο του σφικτήρα.

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:** Και τα 9 νεογνά δεν είχαν άλλα συνοδά νοσήματα ή ανατομικές ανωμαλίες. Διαπιστώθηκε φυσιολογικός πρωκτός σε έκτοπη θέση περιβαλλόμενος μερικώς ή πλήρως από τον έξω σφικτήρα του πρωκτού. Δόθηκαν οδηγίες παρακολούθησης των κενώσεων και επανεκτίμηση σε 6 μήνες και 1 χρόνο μετά, ή επί ουρολοιμώξεων. Δεν διαπιστώθηκε διαταραχή των κενώσεων ή ουρολοίμωξη σε κανένα από τα βρέφη.

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:** Η πρόσθια θέση του πρωκτού είναι μια φυσιολογική παραλλαγή της θέσης του πρωκτού. Η εξέταση υπό νάρκωση, όταν υπάρχει αμφιβολία, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην διαφορική διάγνωση με το ορθοπερινεϊκό συρίγγιο το οποίο χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης.