

# Ατρησίες Εντέρου

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα  
Χειρουργικής Παιδων 2012



# Ορισμός - ταξινόμηση

- Συγγενές έλλειμμα της συνέχειας του αυλού
- A- + τρήσις ( τιτρώσκω ή τιτραίνω = διαπερνώ)
- Πλήρης ατρησία ή στένωση
- Συνηθέστερη αιτία εντερικής απόφραξης στα νεογνά
- Ατρησία πυλωρού
- Ατρησία 12/λου
- Ατρησία λεπτού εντέρου
- Ατρησία παχέος εντέρου

# Συχνότητα – Ομοιότητες και Διαφορές

- **Ατρησία 12/λου:** 1:2500 γεννήσεις ζώντων, συχνό σύνδρομο Down (40%)
- **Ατρησία λεπτού:** 1:1000 γεννήσεις, σπάνιο σύνδρομο Down
- **Ατρησία παχέος:** Πολύ σπανιότερη (2-15% του συνόλου), συνοδεύεται συνήθως από megacolon
- **Επίπτωση:** Ιση και στα δύο φύλα
- **Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά:** Προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης, δίδυμη κύηση, κοιλιακή αιμορραγία, συγγένεια μεταξύ των γονέων

# Ιστορική αναδρομή

- **Ατρησία 12/λου:** 1<sup>η</sup> περιγραφή 1733  
1<sup>η</sup> επιτυχής επέμβαση 1917
- **Ατρησία λεπτού:** 1<sup>η</sup> περιγραφή 1734  
1<sup>η</sup> επιτυχής επέμβαση 1911
- **Πρόγνωση :** Συνήθως κακή μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, λόγω καθυστερημένης προσέλευσης του νεογνού και δυσκινησίας του διατεταμένου κεντρικού κολοβώματος, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη χρόνιας απόφραξης, συνδρόμου τυφλής έλικας και κακής θρέψης.
- **Θεαματική βελτίωση της επιβίωσης** με την κατανόηση της αιτιολογίας, την βελτίωση των χειρουργικών μεθόδων και την εξέλιξη της νεογνολογίας

